



GALLIPRANT 20 mg
GALLIPRANT 60 mg
GALLIPRANT 100 mg

FICHA TÉCNICA COLOMBIA

Página 1 de 3

GALLIPRANT 20 mg Registro ICA No. 10567-MV
GALLIPRANT 60 mg Registro ICA No. 10566-MV
GALLIPRANT 100 mg Registro ICA No. 10560-MV

FICHA TECNICA

FÓRMULA:

Cada comprimido/tableta de Galliprant 20 mg contiene:

Grapiprant 20 mg

Excipientes c.s.p. 1 comprimido de 250 mg

Cada comprimido/tableta de Galliprant 60 mg contiene:

Grapiprant 60 mg

Excipientes c.s.p. 1 comprimido de 750 mg

Cada comprimido/tableta de Galliprant 100 mg contiene:

Grapiprant 100 mg

Excipientes c.s.p. 1 comprimido de 1.250 mg

INDICACIONES:

En perros para el control del dolor y la inflamación asociados a osteoartritis.

FORMA FARMACÉUTICA:

Comprimido/tableta

DOSIS, FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Dosis principio activo: administrar una dosis objetivo de 2 mg/kg de peso corporal, una vez al día, lo que equivale a un rango de dosis de 1,5 - 2,9 mg/kg de peso corporal.

Dosis de producto: administrar Galliprant una vez al día de acuerdo con la siguiente tabla:

Peso del perro (kg)	Galliprant 20 mg	Galliprant 60 mg	Galliprant 100 mg
3.6-6.8	0.5		
6.9-13.6	1		
13.7-20.4		0.5	
20.5-34.0		1	
34.1-68.0			1
68.1-100.0			2

No hay límite máximo para la duración del tratamiento. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada al mismo. Como los estudios de campo se limitaron a 28 días, el tratamiento a largo plazo deberá ser cuidadosamente considerado y el veterinario deberá hacer un seguimiento regular. Dado que los signos de osteoartritis canina experimentan altibajos, en algunos perros puede ser beneficioso seguir un tratamiento intermitente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Administrar por vía oral con o sin alimento.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS:

En perros tratados con grapiprant, se han observado las siguientes reacciones adversas leves y generalmente transitorias: vómitos, heces blandas o mucosas, diarrea e inapetencia.

En los perros tratados con dosis aumentadas de grapiprant se han observado descensos leves en las concentraciones de seroalbúmina y de proteínas totales, pero no se asociaron a ninguna observación o evento clínicamente significativo y fueron reversibles cuando el tratamiento fue desconocido.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

La seguridad de grapiprant no se ha establecido en perros con un peso inferior a 3.6 kg o menores de 9 meses de edad. Por lo tanto, no se recomienda el uso del medicamento en estas condiciones.

Usar con precaución en perros que sufren de enfermedad hepática, cardiovascular o renal preexistente, o con enfermedad gastrointestinal.

El uso concomitante de grapiprant con otros antiinflamatorios no ha sido estudiado y se debe evitar.

Los estudios de laboratorio en ratas no muestran evidencia de efectos teratogénicos ni ningún efecto adverso sobre la capacidad reproductiva de machos y hembras. No se ha determinado la seguridad del grapiprant en perros gestantes, lactantes o reproductores.

Por lo anteriormente mencionado, no administrar durante preñez, lactancia ni en animales reproductores.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Grapiprant no es un potencial inhibidor de la vía de metabolismo mediado por CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4. Grapiprant es un sustrato, pero no un inhibidor del transporte de glicoproteína-P. El tratamiento previo con otros antiinflamatorios puede ocasionar una gravedad adicional o mayor de los efectos adversos y, por tanto, antes de comenzar el tratamiento con grapiprant, deberá respetarse un periodo sin tratamiento con este tipo de medicamentos veterinarios. En el periodo sin tratamiento se deberán tener en cuenta las propiedades farmacéuticas de los medicamentos usados anteriormente. No se ha estudiado el uso concomitante de medicamentos veterinarios ligados a proteínas con grapiprant. Los medicamentos veterinarios ligados a proteínas usados más comúnmente son medicamentos cardiacos, anticonvulsivos y del comportamiento. En animales que necesiten un tratamiento complementario. En animales que necesitan un tratamiento complementario es preciso comprobar la compatibilidad de los medicamentos.

PRESENTACIONES: Frascos blancos redondos de polietileno de alta densidad (PEAD) sellados por inducción con tapón roscado de seguridad a prueba de niños con rollo de rayón por 7 o 30 comprimidos.



GALLIPRANT 20 mg
GALLIPRANT 60 mg
GALLIPRANT 100 mg

FICHA TÉCNICA COLOMBIA

Página **3** de **3**

USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Elaborado por:
Argenta Manufacturing limited.
Fabricado para: Elanco Colombia S.A.S

Galliprant, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas comerciales de Elanco o sus afiliadas. ©Elanco o sus afiliadas.

PM-CO-21-0277

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO